

Наименование Сирень Ами Шот (лат. *Syringa vulgaris* "Ami Schott")

Научная классификация Ясноткоцветные, Маслиновые, Сирень

Основная характеристика Сирень Ами Шотт - сорт с темно-кобальтовыми махровыми цветками, собранными в крупные соцветия. Длина соцветий – 25 сантиметров. Среднерослый кустарник, достигающий 4 м в высоту и 4 м в ширину. Годовой прирост объема — 30 см. Листья сердцевидной формы, темно-зеленые, с заостренным кончиком. Цветение с мая по июнь.



Высота взрослого дерева, м 4

Характеристика кроны Полураскидистый

Период цветения Май-июнь

Характеристика цветов окрас - темно-синий, размер - мелкий, форма - Цветки собраны в стоячие узкие соцветия, в нижней части многоярусные, аромат - цветочный, ярко выраженный

Характеристика листвы (хвои) сердцевидной формы, темно-зеленые, с заостренным кончиком, листья крупные, темно-зеленый, форма листа сердцевидной, ежегодный прирост – 30 см.

Морозостойкость USDA 3 (до -40°C)

Возможность применения Сирени принадлежат к наиболее популярным, прекрасно цветущим кустарникам, издавна широко используемым в садах и парках. Их высоко ценят за красивый облик, обильное и продолжительное цветение с приятным ароматом. В садово-парковом строительстве чаще всего используют сирень обыкновенную и ее многочисленные сорта, но весьма эффектны и другие дикорастущие виды сирени, также нашедшие свое место в озеленении. Помимо использования кустарников в групповых и солитерных посадках, растения отлично подходят для создания красивых живых зеленых изгородей. Такие ограждения не только станут оригинальным дополнением сада, но и порадуют владельца нежными ароматами. Сирень садовая отлично сочетается с хвойными вечнозелеными кустарниками и деревьями. Неплохо куст будет смотреться с яркими пионами, которые будут цвести в одно время с сиренью. При формировании композиций из кустов сирени и пионов, важно также учитывать цветовую гамму растений. Оптимальный вариант — белая сирень в сочетании с такими же белыми пионами. Композиции не нуждаются в специальном уходе, не требуют регулярного полива.

Предпочтение к почве Почва должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.

Местоположение солнечное/полутень

Расстояние между растениями от 2 до 3 м

Особенности посадки и ухода

Посадка.

Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 - 3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных почвах - не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной

или компост (15 - 20 кг), древесная зола (200 - 300 г), суперфосфат (20 - 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают. Кислотность равна 6,6 — 7,5. Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 — 30 см. Крону умеренно, на 2 - 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его. После посадки проводят обильный полив, почву вокруг мульчируют торфом или перегноем.

Уход.

Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см. В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 — 60 г мочевины или 65 — 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 - 3 года на глубину 6 - 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной - 35 — 40 г, калийная селитра — 30 — 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение - зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков. Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 - 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви - основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости - в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.