

Наименование Слива Байкальская (лат. *Prunus salicina* Lindl)

Научная классификация Розоцветные, Розовые, Слива

Основная характеристика Сеянец от свободного опыления Амурской ранней 61-43. Сорт селекции Бурятской плодово-ягодной опытной станции и Научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Авторы: В.С. Путов, И.А. Пучкин, Г.Т. Киргизова, А.С. Шолохова, Э.Г. Сократова, Д.А. Маркова. Передан в госсортоиспытание 1996 г.

Высота взрослого дерева, м до 5м

Характеристика кроны ширококораскидистая, средней густоты

Период цветения май

Период созревания и плодоношения август

Характеристика плодов Плоды крупные, средней одномерности, симметричные. Форма плода

неправильно округло-коническая. Вершина плода значительно вытянутая, воронка мелкая. Основание плода с углублением, ямка средняя. Брюшной шов глубокий, выделяющийся. Плодоножка короткая, средней

Самоплодность самобесплодны

Опылители нужно одно, а лучше два-три дерева другого сорта сливы рядом, причем должны совпадать сроки цветения. Если неизвестно, кто будет хорошим опылителем для сорта Байкальская, то просто посадите рядом несколько разных сортов

Цвет плодов коричневые с темно-розовым оттенком, голые.

Вес плода средняя масса 17,0 г, максимальная – 23 г

Вкус плода сладкий

В каком возрасте начинается плодоношение на 6-7 год жизни

Характеристика цветов окрас - белые, размер - средние, форма - соцветие зонтик, цветки двойные, розовидные.

Характеристика листвы (хвои) - листья средние, зеленые, форма листа - эллиптическая, длиннозаостренные, гладкие. Пластинка листа вогнутая лодочкой, вершина листа постепенно заостренная, основание округлое, опушенность отсутствует. Край листа двоякогородчатый, прилистники сильно рассеченные, одноцветные с листьями, длиной 10см.

Морозостойкость USDA 2 (до -43°C)

Возможность применения Основное назначение – потребление в свежем виде.

Предпочтение к почве плодородной, рыхлой, влажной, чистой от сорняков почве

Местоположение солнечное

Особенности посадки и ухода Средне жароустойчив. Еще одной проблемой является повреждение цветков сливы ранневесенними заморозками, что ведет к потере урожая. Цветки большинства сортов нормально переносят заморозки в течении 3 часов с понижением температуры до -2°C, теряют до 30% цветков при -4°C и практически полностью лишаются их при -6°C. Бутоны еще более чувствительны к низким температурам.

