

Наименование - Рябина черноплодная Арония (лат. Aronia melanocarpa)

Научная классификация - Розоцветные Розовые Арония

Основная характеристика - Кустарник до 3 м высоты с компактной, позже раскидистой кроной и темно-зелеными, глянцевыми листьями, осенью-багряные, алые, оранжевые, бордовые; плоды круглые, черные, блестящие, съедобные. Светолюбива, выносит небольшое затенение. Устойчива в городских условиях. Нетребовательна к почвам, предпочитает хорошо увлажненные, рыхлые, плодородные, нейтральные почвы. Зимостойкость в Тюмени высокая. Хорошо переносит обрезку, устойчива к вредителям и болезням. Рекомендуется для , живых изгородей, укрепление склонов и солитеры.



Высота взрослого дерева - 2-3 м

Характеристика кроны - кустарник с раскидистой кроной

Период цветения - май-июнь

Период созревания и плодоношения - август-сентябрь

Характеристика плодов - Плоды ягодовидные округлой или шаровидной формы, с темно-коричневыми семенами, черного или черно пурпурного цвета, с легким восковым налетом, собраны в гроздья, урожайность в кг с одного взрослого саженца в год - 9-15кг

Самоплодность - самоплодная

Цвет плодов - черный

Вес плода - от 1 до 1.5гр

Вкус плода - терпко-сладкие

В каком возрасте начинается плодоношение - на 2-3 год

Транспортабельность - хорошая

Лежкость - хорошая

Осыпаемость - нет

Характеристика цветов – окрас цветка - белый/нежно-розовый, размер цветка - мелкий, форма цветка - собраны в щитковидные соцветия, аромат цветка - сильный

Характеристика листвы - с пильчатым краем. располагаются на коротких черешках, размер листа - мелкие, окрас - темно-зеленый. Осенью листья приобретают эффектные багряные, алые, бордовые, оранжевые оттенки, форма - очередные обратнояйцевидные или эллиптические, ежегодный прирост от 20 до 40 см

Морозостойкость - USDA 3 (до -40°C)

Возможность применения - Способы использования этих чудесных ягод ограничены только вашей фантазией – варенье, джемы, компоты, настойки. И из листьев вы всегда сможете сделать полезные отвары и настои, которые помогут всей вашей семье пережить зиму без болезней. .плоды и листья черноплодной рябины устойчиво понижают давление, расширяя сосуды. Для борьбы с гипертонией выдавливается сок из ягод аронии, который пьют трижды в день. Можно также запаривать сухие плоды и листья в термосе, и пить целебный напиток вместо чая. .Подходит для посадки в свободных или формованных живых

изгородях, как компонент цветущей живой изгороди. Купить аронию черноплодную можно для использования в среднем или нижнем ярусе опушечных композиций, отличный фон для невысоких хвойных пород, для вечнозеленых рододендронов.

Предпочтение к почве - нетребовательна, переносит умеренно кислые и щелочные почвы. Предпочитает хорошо увлажнённые, рыхлые, плодородные почвы. Плохо переносит сильную кислотность почвы. Солеустойчива.

Местоположение - солнечное

Особенности посадки и ухода - В посадочную яму глубиной 50-60 см на треть заполняют грунтом, хорошо проливают отстоянной водой и ждут, когда влага полностью уйдет вглубь. Затем саженец погружают в яму так, чтобы корневая шейка находилась на пару сантиметров над уровнем грунта, засыпают подготовленным субстратом, уплотняют его и снова поливают, чтобы кустарник хорошо осел на грунт. Приствольный круг, во избежание быстрого высыхания земли и образования корки, обильно мульчируют. Саженцы с открытой корневой системой высаживают в апреле-мае и сентябре-октябре, с комом земли из контейнера – с ранней весны до поздней осени.

Арония свето- и влаголюбива, но при этом крайне неприхотлива. До 7-8-летнего возраста делают санитарную обрезку, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые, поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя им на смену 3-5 молодых побегов. В период вегетации и образования плодов требуется регулярный полив в вечернее время. Арония нетребовательна к теплу, морозостойка. Хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений. Устойчива к вредителям и болезням. В период массового появления личинок вредителей на поверхности листьев кусты следует обработать инсектицидами. Болезней на черноплодной рябине не замечено.