

Наименование Груша Куюмская (лат. *Pyrus communis* L)

Научная классификация Розоцветные, Розовые, Груша

Основная характеристика Раннеосенний сорт получен в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко посевом семян от свободного опыления сортов-лукашенок. Авторы сорта: В.С. Путов, И.А. Пучкин. Районирован в Западно-Сибирском регионе.

Высота взрослого дерева, м до 3,5м

Характеристика кроны округлая средней густоты, хорошо облиственная

Период цветения май

Период созревания и плодоношения Плоды созревают в конце августа, хранятся не более 8 дней.

Характеристика плодов Преобладающий тип плодовых образований – простые и сложные кольчатки. Плоды мелкие, короткогрушевидные. Кожица грубая, шероховатая. Подкожных точек много: они среднего размера, оржавленные. Плодоножка длинная, средней толщины, изогнутая. Воронка не выраже

Опылители Лучшие опылители – Лель, Северянка.

Цвет плодов Основная окраска в период съемной зрелости зеленовато-желтая, при потребительской – светло-желтая, покровная отсутствует.

Вес плода 50 - 65 г

Вкус плода Мякоть белая, плотная, грубая, мелкозернистая, посредственного вкуса.

В каком возрасте начинается плодоношение на 4ый год жизни

Характеристика листвы (хвои) листья средние, светло-зеленые, форма листа яйцевидные с винтообразно скрученной верхушкой, с мелко-пильчатыми краями.,

Морозостойкость USDA 1 (до -48°C)

Возможность применения Сорт технического назначения.

Предпочтение к почве супесчаная, суглинки/глина.

Местоположение солнечное

Расстояние между растениями от 3 до 4 м

Особенности посадки и ухода Сразу после посадки саженцу груши делают формирующую обрезку. Чтобы стимулировать ветвление, однолетки укорачивают на 1/3. У двулетки конкурирующий с лидером побег укорачивают на 2/3, подрезают на 1/3 и другие ветви: нижние – меньше, верхние - больше. В дальнейшем делают только санитарную обрезку, удаляя подсохшие и поломанные веточки, а также те, что растут внутрь кроны. Как только у груши длина годовых приростов становится короче 35 см, наступает пора её подкармливать. Обычно это наблюдается на 5-7 год и связано с началом плодоношения. У груши глубокие стержневые корни, поэтому подкормки достигнут цели, если будут внесены в питающие шурфы или отверстия, проделанные ломом по периферии кроны на глубину 45-50 см. Подкормки по поверхности безрезультатны. Используются комплексные минеральные и органические удобрения. Целесообразнее это делать весной, после оттаивания земли. Груша любит хорошее увлажнение. Поливать её следует не часто, но обильно. Землю по проекции кроны занимать ничем не надо. Её следует держать под мульчей из перепревшего навоза, торфа, можно под чёрной плёнкой, чтобы не полоть. Особенность груши –



пониженная зимостойкость в молодом возрасте, поэтому для защиты в первые годы полезно зарывать дерево в снежный холм. С началом плодоношения зимостойкость резко возрастает.