

Наименование Дерен белый Aurea (лат. Cornus alba Aurea)

Научная классификация Кизилоцветные, Кизиловые, Кизил

Основная характеристика Листопадный кустарник до 2,5 м высотой, крона густая, раскидистая. Растёт быстро. Побеги прямостоячие, молодые побеги красновато-бордовые. Листья широкояйцевидные, крупные, до 10-12 см длиной.

Высота взрослого дерева, м до 2,5м

Характеристика кроны Крона плотная, густая, образуется прямыми побегами красно-коричневой корой.

Период цветения май-июнь

Период созревания и плодоношения июнь

Характеристика плодов Плоды несъедобные, они содержат горькие вещества и умеренно ядовиты для людей, хотя охотно поедаются птицами.

Самоплодность самоплодное

Цвет плодов голубые

Вкус плода горькие

В каком возрасте начинается плодоношение от 4 лет

Транспортабельность низкая

Характеристика листвы (хвои) Листья розовато-коричневые, затем нежно-желтые, матовые. Осенью незначительно краснеют., листья крупные, зеленый, форма листа овальная форма с заостренным концом, ежегодный прирост - до 50см

Морозостойкость USDA 3 (до -40°C)

Возможность применения Привлекателен в ландшафтном дизайне, идеально подходит для живых изгородей.. Плоды несъедобны, но служат хорошим кормом для птиц, что способствует поддержанию экосистемы сада.

Предпочтение к почве песчаная-супесчаная (легкая), Суглинистая, Глинистая

Местоположение солнечное/полутень

Расстояние между растениями 1,5-2,5 м

Особенности посадки и ухода Лучшее время для посадки дерена белого – ранняя весна/осень. Лучше всего подойдут полутеневые участки. В грунт перед посадкой необходимо добавить перегной либо торф. Расстояние между посадками не должно быть меньше 0,7 - 1 метра. Глубина посадочной ямы – 0,5 – 0,7 метра. Дно желательно присыпать дренажем (хорошо подойдет щебень). Молодым саженцам необходим частый полив, особенно весной и летом. После полива, для сохранения влаги, необходимо провести мульчирование. Подкорм осуществляется раз в год летом. Взрослые растения стоит поливать пару раз в месяц и в засушливые периоды. Хорошо переносит обрезку. Может подвергаться нападению тли. В этом случае растению требуется обработка инсектицидами.

